INSTRUÇÃO DE PREPARAÇÃO DE COLHEITA

ÁCIDO 5-HIDROXI-INDOLACÉTICO (5-HIAA)

(Colheita de urina)

Quatro (4) dias antes do início da colheita e inclusive o 4º dia (início da colheita):



NÃO PODE COMER/BEBER:

- Banana
- Kiwi
- Abacate
- Abacaxi
- Chocolate
- Ameixa
- Beringela
- NozesCafé
- Tomate
- Amendoim
 Bebidas Alcoólicas

(

PODE COMER/BEBER:

- Pão
- Carne
- Manteiga
- Água
- Ovos
- Refrigerantes com cola
- Acúcar
- Bebidas Alcoólicas

Nota: Deve abster-se também de fumo.

Algumas medicações podem alterar o resultado do exame:

- Acetaminofeno
- Xaropes para tosse
- Metocarbamol
- Inibidores da MAO

- Salicilatos
- Naproxeno
- Imipramina
- Metenamina

- Fenacetina
- Mefenesina
- Isoniazida
- Metildopa
- soniazida Met
 - Fenotiazina

Evite o uso de medicamentos durante o período da dieta e colheita da amostra.

Medicamentos prescritos só devem ser suspensos a critério do médico assistente.

Manter o frasco com a Urina de 24 horas sob refrigeração. Colher todo o volume de urina em 24 horas (às 8:00h do dia da colheita, urinar e desprezar este volume; após, colher todo o volume até às 8:00h do dia seguinte).

ATENÇÃO: O recipiente contém ácido clorídrico (corrosivo). Não ingerir. Não inalar. Evitar contacto com a pele ou mucosas. Em caso de contacto, lavar abundantemente com àqua. Manter afastado das ciranças.

