



## ÁCIDO VANILMANDÉLICO (VMA)

Esta análise, determinada numa urina de 24 horas acidificada, sofre interferência de alguns alimentos e medicamentos.

### Durante os 5 dias prévios à colheita da urina

#### NÃO CONSUMIR:

- Baunilha
- Banana
- Gelados
- Café
- Sumos de fruta
- Bebidas alcoólicas
- Chá
- Conservas
- Tabaco
- Chocolate
- Refrigerantes

2 Semanas antes da colheita deve suspender a medicação (só com autorização do médico assistente) que contenha:

- Fenotiazinas
- Reserpina
- Sais de Lítio
- Ácido Acetilsalicílico
- Piridoxina
- Inibidores da MAO
- Dissulfiram
- Adrenalina
- Teofina
- Levodopa
- Nitroglicerina
- Etanol e nicotina

Manter o frasco com a Urina de 24 horas sob refrigeração. Colher todo o volume de urina em 24 horas (às 8:00h do dia da colheita, urinar e desprezar este volume; após, colher todo o volume até às 8:00h do dia seguinte).

O resultado analítico só é exacto e preciso se a colheita, primeira etapa da análise clínica, for também rigorosa e precisa.

**ATENÇÃO:** O recipiente contém ácido clorídrico a 25% (corrosivo). Não ingerir. Não inalar. Evitar contacto com a pele ou mucosas. Em caso de contacto, lavar abundantemente com água. Manter afastado das crianças.

