



PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 6 AMOSTRAS

Para garantir a fiabilidade dos resultados, é essencial seguir corretamente as seguintes orientações:

Importante:

- A colheita não pode ser realizada quando se verificar a presença de hemorragias;
- A colheita não pode ser realizada se estiver a tomar anti-inflamatórios (como por exemplo: aspirina, ibuprofeno, nimesulida, etc);
- A colheita não pode ser realizada durante o período menstrual;
- Certificar-se de que possui 6 frascos estéreis, 2 frascos identificados com o nº 1, 2 frascos com o nº 2, e 2 frascos com o nº 3, fornecidos pelo Laboratório/Unidade de Colheitas.

Procedimento de colheita:

1. Recolher as fezes de três dias consecutivos (salvo indicação médica em contrário), utilizando os frascos fornecidos e respeitando a ordem numérica indicada (1, 2 e 3);
2. Utilizar a colher integrada como unidade de medida (uma colher corresponde a uma porção de amostra. Não colocar mais do que uma porção no mesmo frasco);
3. Cada dia de recolha tem dois frascos identificados com o mesmo número.
Fazer a recolha da seguinte forma:
 - 1º dia - Recolher duas porções distintas de fezes da mesma dejeção; Colocar uma porção num dos frascos identificados como "1" e outra porção no segundo frasco identificado como "1";
 - 2º dia - Recolher duas porções distintas de fezes da mesma dejeção; Colocar uma porção num dos frascos identificados como "2" e outra porção no segundo frasco identificado como "2";
 - 3º dia - Recolher duas porções distintas de fezes da mesma dejeção; Colocar uma porção num dos frascos identificados como "3" e outra porção no segundo frasco identificado como "3";
4. Conservar as amostras em local fresco e seco até à sua entrega no Laboratório/Unidade de Colheitas;
5. Entregar os seis frascos de amostras no Laboratório/Unidade de Colheitas no fim da recolha da última amostra.

Observações:

- O incumprimento destas instruções pode comprometer a qualidade da amostra e a precisão dos resultados.

