



PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 3 AMOSTRAS

Para garantir a fiabilidade dos resultados, é essencial seguir corretamente as seguintes orientações:

Importante:

- A colheita não pode ser realizada quando se verificar a presença de hemorragias;
- A colheita não pode ser realizada se estiver a tomar anti-inflamatórios (como por exemplo: aspirina, ibuprofeno, nimesulida, etc);
- A colheita não pode ser realizada durante o período menstrual;
- Certificar-se de que possui 3 frascos estéreis, identificados com os números 1, 2 e 3, fornecidos pelo Laboratório/Unidade de Colheitas.

Procedimento de colheita:

1. Recolher as fezes de três dias consecutivos (salvo indicação médica em contrário), utilizando os frascos fornecidos e respeitando a ordem numérica indicada (1, 2 e 3);
2. Utilizar a colher integrada como unidade de medida (uma colher corresponde a uma porção de amostra. Não colocar mais do que uma porção no mesmo frasco);
3. Fazer a recolha da seguinte forma:
 - 1º dia - Recolher uma porção de fezes para o frasco 1;
 - 2º dia - Recolher uma porção de fezes para o frasco 2;
 - 3º dia - Recolher uma porção de fezes para o frasco 3;
4. Conservar as amostras em local fresco e seco até à sua entrega no Laboratório/Unidade de Colheitas;
5. Entregar os três frascos de amostras no Laboratório/Unidade de Colheitas no fim da recolha da última amostra.

Observações:

- O incumprimento destas instruções pode comprometer a qualidade da amostra e a precisão dos resultados.

